

FRÓÐSKAPARSETUR
FØROYA

HEILSUFRAMI OG FYRIBYRGING

Sum partur av sjúkrarøktarfróðiútbúgvingini á Fróðskaparsetri Føroya verður skrivað grein innan heilsufremjan og fyrirbygging. Tey lesandi eru tá komin um hálva leið í útbúgvingini. Hesar greinar víðgera sjúkrarøktarfakligan spurdóm innan heilsufrema og/ella fyrirbygging í samfelagsligum høpi. Komandi vikurnar prentar Vikuskifti nakrar av hesum greinum

KRABBAMEIN

KENNUR TÚ
TÍN PROSTATA

Í FØROYUM FÁA 28 MENN STAÐFEST PROSTATAKRABBA UM ÁRIÐ. HÓAST NÆRUM HVØR EINASTI MAÐUR FYRR ELLA SEINNI FÆR PROSTATAKRABBA, SO MERKJA TEIR FLESTU EINKI TIL TAÐ. SJÚKAN KEMUR SNÍKJANDI OG KANN KOMA LANGT, ÁÐRENN HON VERULIGA GER VART VIÐ SEG. ENN FINST EINGIN KANNING, IÐ KANN STAÐFESTA, UM TÚ ERT Í VANDA FYRI AT ÚTVIKLA PROSTATAKRABBA. MENN MUGU TÍ VERÐA VARUGIR VIÐ TÆR BROYTINGAR, SUM SJÚKAN HEVUR VIÐ SÆR, OG VIÐ MINSTA ILLGRUNA, SKALT TÚ RINGJA TIL LÆKNAN

Prostatakrabbi er mest vanligi krabbin millum menn og her heima doyggja tíggju av sjúkuni árliga. Sjúkan sæst mest hjá monnum eldri enn 50 ár, og vandin fyri at fáa sjúkuna økist við aldrinum.

Seinastu árin er talið av monnum, ið fáa staðfest krabba í prostata vífaldað. Hetta er tí, at fleiri menn lata seg kannu og tí fáa staðfest sjúkuna.

Mett verður, at ein av trimum krabbatilburðum kunnu fyrirbyggjast, um mann er tilvitaður um sína heilsu. Vansar sum m.a. royking, yvirvekt, alkohol og kropsligt óvirkni økja um vandan fyri at fáa krabba. Sjúkan er sostatt í mongum førum orsakað av okkara lívstíli.

Aldursteikin ella krabbi

Prostata veksur við aldrinum, og er ein vanlig óskaðilig sjúka millum eldri menn. Hetta verður nevnt forstørð prostata. Forstørð prostata verður bara viðgjørt, tá ið tað gevur trupulleikar við at lata vatnið, av tí at prostata trýstir á urinrørið. Tað er vanligt, at menn við forstørðum prostata kunnu hava ringt við at lata vatnið.

Aldurin kann geva trupulleikar við at lata vatnið. Sum oftast er tað ikka alvorligt, men tó skal ein taka tað alvor-

Tekin upp á prostatakrabba:

- Veik urinstrála
- Trupulleikar at lata vatnið
- Føilir at bløðran ikki verður tømd
- Ofta á vesi gjøgnum samdøgrið
- Bráðlig trongd til vatnaling
- Blóð í urinum
- Blóð í sáðnum
- Minkandi ella manglandi sáðmongur
- Manglandi kynshugur
- Bløðrubruni
- Varandi pína í lendunum og rygginum
- Reisningstrupulleikar
- Varandi hovin bein
- Møði
- Vekttap
- Annarhvør maður eldri enn 60 ár hevur prostatakrabba, vísa kanningar. Teir fæstu merkja nakað til tað og liva við sjúkuni, uttan at hon ger vart við seg. Tað er tó minnilutin, ið fær ein aggressivan form fyri prostatakrabba. Tí er umráðandi, at menn vita, hvørji tekin eru knýtt at sjúkuni, og fara til lækna, soleiðis at læknin kann staðfesta, um talan er um góðkynjað ella illkynjað forstørð prostata. Tekin upp á sjúkuna kunnu vera; trupulleikar at lata vatnið, blóð í urinum, blóð í sáðnum ella ryggpína

ligt og lata seg kannu. Fyrstu tekini um prostatakrabba eru tey somu sum við forstørð prostata. Krabbin kann tó spjæða seg út í nærliggjandi vevnað og beinagrind, og byrjar tá at geva onnur tekin.


Krabbin kann arvast

Ein útav tíggju, ið fáa prostatakrabba, fáa krabba orsakað av ættarbrögdi. Illgruni er um, at helvtin av hesum tilburðum eru aggressiv og ólekjandi og koma fyri áðrenn 55 ára aldur. Menn, har t.d. pápin ella abbin hevur fingið staðfest sjúkuna, skulu lata seg kannu, tá ið teir eru 5-10 ár yngri enn pápin var, tá ið hann fekk staðfest krabba.

Hetta verður gjørt við einari PSA blóðroynd, ið gevur eina mynd av, hvør aktivitetur er í prostata. Um nøgðin av PSA er hækkað, kann tað verða tekin upp á krabba, men tað kann eisini bara vera forstørð prostata, ella bløðrubruni. Neyðugt er tí við útgreinandi kanning hjá serlækna. Mælt verður til, at menn, ið hava prostatakrabba í familjuni, taka eina PSA blóðroynd eina ferð um árið, eftir at teir eru blivnir 40 ár.

Ivasom screening

Endamálið við screening er at finna sjúkuna skjótast møguligt fyri at fyrir-



Prostata er ein kertil, ið situr runt um urinrørið hjá monnum. Hann liggur beint undir bløðruni og framman fyri endatarmin. Prostata framleiðir sáðvætu. Undir avgongu trekkir prostata seg saman og blandar sáð og sáðvætu, soleiðis at sáðið svimur betur. Prostata veksur við aldrinum og vøksturinn kann antin vera góðkynjaður ella illkynjaður.

Góð ráð:

- Et fullkorn hvønn dag
- Et grønmeti hvønn dag
- Et frukt hvønn dag
- Et fisk og skeljadjór, helst fleiri ferðir um vikuna
- Spar upp á feittið, helst frá kjöti og mjólkaúrdrætti
- Ver kropsliga virkin, minst 30 min. um dagin

Fert tú ofta á vesi bæði um dagin og um náttina, hevur tú eina veika urinstrálu og føilir tó ofta, at tú bráðliga hevur trongd til at lata vatnið? So skalt tú vera uppmærksamur



Ein útav tíggju, ið fáa prostatakrabba, fáa krabba orsakað av ættarbrögdi

prostatakrabba, men krabbameins-ætlanin fyri 2009 viðmælir, at PSA royndin verður nýtt, tá ið ítøkiligur illgruni er um prostatakrabba. Tað vil siga, at menn, ið hava eyðkennir fyri sjúkutekini, ella har prostatakrabbi er í familjuni.

Granskað verður í lötuni í at finna eina roynd, sum meira nágreinligt kann vísa, um ein er í vandabólki fyri at útvikla prostatakrabba, og á tann hátt seta inn við viðgerð og harvið minka um deydilgheitina.

Hvat kanst tú gera?

Mett verður, at ein av trimum krabba-

byrgja ella lekja sjúku og minkar um deydilgheitina. Í samband við prostatakrabba verður PSA blóðroyndin nýtt. Blóðroyndin gevur eina ábending um krabba, men úthýsir ikki, at talan er um góðkynjaða sjúku. Kanningin visir heldur ikki, um talan er um friðaligan ella aggressivan krabba.

Vandi við screening er tí, at fleiri menn, ið hava friðaligan krabba verða settir í viðgerð, sum kann hava keðiligar avleiðingar, so sum óviljað vatnlát og impotens. Kanning visir eisini, at talið av monnum, ið doyggja av prostatakrabba ikki er minkað í teimum londum, sum screena við PSA.

Í Føroyum verður ikki screenað fyri

tilburðum kunnu fyrirbyggjast, um man er tilvitaður um sína heilsu. Vansar sum royking, yvirvekt, alkohol, kropsligt óvirkni, stráling og ígerðir økja um vandan fyri at fáa krabba. Sjúkan er sostatt í mongum førum orsakað av okkara lívstíli.

Familjur eru ofta útsettar fyri somu umhvørvisávirkanum, harímillum mat og rørsluvánur. Um prostatakrabbi er í familjuni, kann krabbin tískil líka gjarna vera orsakaður av lívstíli.

Kanningar benda á, at mettað feitt, t.v.s. feitt frá kjöti, feittum osti og feittum mjólkaúrdrættum økja um vandan fyri prostatakrabba. Harafurtímótist sæst, at

kostur, ið inniheldur t.d. kál, fullkorn og omega-3 feittsýrur frá feittum fiski minkar um útviklingin av sjúkuni. Mangt bendir á, at frukt og grønmeti fyrirbyggja ávís krabbasløg.

Somuleiðis er umráðandi ikki at viga ov nógv. Tað er ferð eftir ferð víst, at javnt kropsligt virkni er við til at minka um vandan fyri krabba. Kropslig rørsla økir um vøddar og minkar um feitt og hevur eina jaliga ávirkan á immunverjuna.

Út frá fólkaheilsukanningini víga føroyskir menn ov nógv. Samlíkt er tí, at teir eru í øktum vanda fyri at útvikla krabba.

Hvat er PSA:

PSA stendur fyri prostata spesifikt antigen, ið verður framleitt í sjálvum prostata og heldur sáðnum flótandi. Vanliga fer ein lítill partur av PSA frá prostata og út í bláðið. Nøgðin av PSA kann tí mátast við eina blóðroynd. SA-talið verður málit fyri at kannu, hvør aktivitetur er í prostata.

Um tú hevur illgruna til prostatakrabba, kann kommunulækkin kannu prostata, og taka ein blóðroynd, ið mátar PSA. Er prostata forstørð, ella er PSA talið ov høgt, verður tú sendur víðari til serlækna, har nærri kanningar verða gjørdar. Um prostatakrabbi verður staðfestur, verður síðani mett um, hvør viðgerð er best.



Skriva greinina hava:

Frá vinstri: Rannvá Laksáfoss, Birita Dahl, Reidunn Djurhuus Magnussen og Lena J. Nybo Hvítkekk